










IMPFUNGEN	Säuglinge				Kleinkinder		Kinder	Jugendliche		Erwachsene		
	6 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	11 - 14 Mo	15 - 23 Mo	2-4 Jahre	5-6 Jahre	9-14 Jahre	15-17 Jahre	ab 18 Jahren	ab 60 Jahren
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie						N		A1	A2		A (alle 10 Jahre)	
Pertussis (Keuchhusten)		6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	N		A1	A2		A ^d	
Poliomyelitis (Kinderlähmung)						N			A		ggf. N	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)						N						
Hepatitis B						N						
Pneumokokken ^a		G1		G2	G3	N						S
Meningokokken (Serogruppe C)					G (ab 12 Monaten)	N						
Rotaviren ^b  		G1	G2	(G3)								
Mumps 					G1 ^c	G2 ^c	N					
Masern 							N					S ^e
Röteln 							N					
Varizellen (Windpocken) 					G1	G2	N					
HPV (Humane Papillomviren)								♀ G1 + G2 ^f	♀ N			
Influenza (Grippe) ^g												S (jährlich)

  Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche


 Schluckimpfung

 Lebendimpfung:
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

 Grundimmunisierung bis zu 4 Teilimpfungen G1 - G4

 Standardimpfung

 Auffrischung

 Nachholimpfung
Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

a Frühgeborene (<37. SSW) erhalten eine zusätzliche Impfung mit 3 Monaten (insgesamt also 4 Impfungen)

b 1. Impfung ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff zwei (Rotarix®) bzw. drei Dosen (RotaTeq®) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

c 1. MMR-Impfung gleichzeitig, aber an anderer Körperstelle als Varizellen-Impfung; 2. Impfung als MMRV-Kombinationsimpfung (in einer Injektion)

d Bei der nächsten Tetanus- und Diphtherie-Auffrischung zusätzlich Pertussis einmalig impfen

e Alle nach 1970 Geborenen mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Impfung. Vorzugsweise als MMR-Kombinationsimpfung

f 2 Impfungen, je nach Impfstoff im Alter von 9 bis 13 (Gardasil®) bzw. 9 bis 14 Jahren (Cervarix®) mit einem Impfabstand von 6 Monaten

g Jährliche Impfung bei chronischen Erkrankungen bereits ab 6 Monaten; einmalig bei Schwangeren